

# Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT                      REG NR                      KLASS                      VERKSAM SUBSTANS

## GODKÄNDA HERBICIDER

**Tomahawk 200 EC** | 5236 | 2L | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**

Mot örtgräs på golfbanor. Max 1 applicering per år. Maxdos 1,8 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

**Overtake** | 5634 | 2L | **Fluroxipyr-1- metylheptylester och Florasulam**

En applicering per år. OBS: endast vårbehandling. Dos vid nyetablering 0,75 l/ha, dos i etablerad gräsyta 1,8 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

## TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

**Roundup Ultra** | 5773 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Mot ogräs och annan vegetation. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Max 1-3 appliceringar/år. Maxdos per applicering: 4 l/ha. Total maxdos får inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingsssäsong. **Godkänt t.o.m.** 2024-12-15.

## GODKÄNDA FUNGICIDER

**Heritage** | 5574 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt-%**

Verknings sätt: Systemiskt. Mot svampangrepp på tee och green på golfbanor. Max 2 appliceringar/år, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 0,5 kg/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

**Medallion TL** | 5075 | 2L | **Fludioxonil 125 g/l**

Verknings sätt: Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Maxdos per applicering: 3 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2026-06-15.

**Instrata Elite** | 5466 | 2L | **Difenokonazol 80 g/l; Fludioxonil 80g/l**

Verknings sätt: Kontakt och systemiskt. Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. **Godkänt t.o.m.** 2024-12-31.

**Exteris StressGard (NY)** | 5799 | 2L | **Fluopyram 12,5 g/l; Trifloxystrobin 12,5 g/l**

Verknings sätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Max 2 appliceringar/år, > 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 10 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-01-31.

**Ascernity** | 5681 | 2L | **Benzovindiflupyr 23,6 g/l; Difenokonazol 78,8 g/l**

Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på tee och green. Max 2 appliceringar, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 3 l/ha. OBS: se särskilda regler kring reducering av vindavdriften i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. **Godkänt t.o.m.** 2024-03-02.

**Signum** | 4884 | 2L | **Pyraklostrobin 6,7 vikt-%; Boskalid 26,7 vikt-%**

Verknings sätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni-november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar. **Godkänt t.o.m.** 2024-01-31.

## GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

**Primo Maxx II** | 5410 | 2L | **Trinexapak (etylester) 116g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Får användas mellan 1 mars och 30 nov, max 40 appliceringar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per applicering: 0,4 l/ha, totalt max 16 l per säsong. Rekommenderad dos och frekvens gäller för green. För tee, fairway och semiruff, se etikett. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-15.

**Clipless NT** | 5320 | 2L | **Trinexapak (etylester) 120g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. Max 24 appliceringar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per applicering: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-15.

**Attraxor** | 5549 | 2L | **Prohexadionkalcium 10 vikt-%**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 21 dygn. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha. För rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten.

**Godkänt t.o.m.** 2027-05-31.

## GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

**Trianium-P** | 5041 | | **Trichoderma harzianum stam T-22**

Applicering vid marktemperatur över +8 grader C. Applicering rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. Max 6 appliceringar/år, behandlingsintervall 28 dygn. Maxdos per applicering: 0,45 g/m<sup>2</sup>. **Godkänt t.o.m.** 2026-04-15.

**Mycostop** | 4295 | 2L | **Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperatur över +15 grader C. Årligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 400 g/ha. **Godkänt t.o.m.** 2024-09-30.

**Prestop** | 4934 | 2L | **Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperaturer mellan +5 och +15 grader C. Årligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 1 kg/ha. **Godkänt t.o.m.** 2035-03-31.

**Harmonix Turf Defence** | 5857 | 2L | **Bacillus amyloliquefaciens**

Mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Produkten får användas vid max 10 tillfällen per år samt med minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle: 25 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2024-04-30

## Mer information

Jordbruksverkets "Hjälpreda" för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom ska alltid användas. Information om avdriftsreducerande utrustning (spridare) vid spridning av växtskyddsmedel finns på [sakertvaxtskydd.se](https://sakertvaxtskydd.se). Rekommenderad dos: se produktens etikett. Vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.

\* Preparat där godkännandet gått ut får, om inte Kemikalieinspektionen kommer med annan info,

- säljas sex månader efter registrerings utgång
- användas och lagras 18 månader efter registrerings utgång (vid ev. myndighetskontroll blir det därefter anmärkning om den finns kvar i kemförrådet)

För mer information om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen: [kemi.se](https://kemi.se).